

Connaissance de la prévention de la fistule obstétricale chez les jeunes femmes en milieu urbain et rural au Burkina Faso

Banke-Thomas AO¹, Siribie A², Kouraogo S³, Taddese HB⁴, Mueller JE⁵

INTRODUCTION

La fistule obstétricale est une séquelle du travail complexe qui si elle n'est pas traitée, laisse les femmes handicapées et socialement exclues. Au Burkina Faso, son incidence est de 6/ 10, 000 consultations, avec plus de victimes issues du milieu rural. L'objectif est d'évaluer les connaissances sur la fistule obstétricale chez les jeunes femmes dans un district sanitaire du Burkina Faso, en comparant les communautés rurales et urbaines.

MATERIEL ET METHODE

C'est une étude transversale avec pour facteurs d'inclusion l'âge (18-20 ans) et la résidence (milieu rural et urbain). Au total, 121 femmes ont été retenues comme échantillon. Les statistiques descriptives et l'analyse de régression logistique multiple ont été utilisées pour comparer les différences entre les groupes et identifier les facteurs prédictifs de niveaux de connaissance observés.

RESULTATS:

Les femmes rurales ont plus de chance de se marier ($p < 0,000$) avec une forte propension de grossesses à l'adolescence ($p = 0,006$). L'enquête a montré globalement une faible connaissance de la fistule obstétricale (36%).

Les femmes du milieu rural étaient moins susceptibles d'avoir de connaissances sur les moyens de prévention par rapport à celles du milieu urbain [OR = 0,35 (95%-IC, de 0,16 à 0,79)]. Cet effet s'explique légèrement par le manque d'éducation [OR = 0,41 (95%-IC, 0,18 à 0,93)] et légèrement sous-estimé en raison du déroulement de la grossesse précédente [OR = 0,27 (95%-IC, 0,09 à 0,79)]. Les médias sont les sources de connaissance les plus citées chez les jeunes femmes urbaines, contrairement à leurs paires du milieu rural (68% contre 23%). La plupart des jeunes femmes rurales connaissent la fistule obstétricale par le bouche- à-oreille (68 % contre 14%). Toutes les participantes conviennent que l'hôpital était plus sûr pour les soins obstétricaux d'urgence. Mais seulement 11,0% pensent pouvoir faire face à des complications de la grossesse qui nécessiteraient un traitement d'urgence.

CONCLUSION

Il ya un besoin urgent d'information des populations sur les risques de fistules obstétricales. À cet égard, les programmes de prévention de la fistule obstétricale doivent être adaptés aux contextes locaux, que ce soit en milieu urbain ou rural. Plusieurs secteurs doivent être mis à profit tels que l'enseignement et les organisations de la société civile.

Contact: kouraogof@yahoo.fr